

Liite. Kuvassa 1 on mekaanista jääeroosiota (liikkuvien jäitten aiheuttamaa) paljon harvinaisempi ilmiö, lämpölaajenemisesta aiheutuva jäitten työntyminen rantaan.

Kuvan 1 lämpölaajenemisesta aiheutuvaan jäitten työntymiseen rantaan pengertie ei vaikuta, mutta kuvien 2-6 tapauksiin vaikuttaa.



Kuva 1: Jäitten lämpölaajenemisesta aiheutunut pienoISRöysä; harvinainen ilmiö.

Kuvat 2-6 esittävät ”röysiä”, jotka aiheuttavat mekaanista jääeroosioita. Röysyjä muodostuu koko lauttaväylän pohjoispuoliselle karikolle ja aina entisen Haukiputaan saarille asti (kuvat 2-6).





Kuvat 2 ja 3. Liikkuvat kevätjääät ovat etelätuulella nousseet aallonmurtajalle Huikussa 21.4.2014. Ilmiö on paljon yleisempi marras-tammikuussa ja aiheuttaa ns. mekaanista jääeroosiota.





Kuva 4. Äijänkumpaleen (vasemmalla) ja itäpuolen röysiä 14.3.2020.



Kuva 5. Pyöräilijä ja Jussinmatalan röysät 14.3.2020.



Kuva 6. Lauttaväylän ja Laitakaran välisiä röysiä 6.1.2020. Nämä ilmiöt pengertie lopettaisi.